

Votre guide d'application

Pr

ARAZLO^{MC}



ARAZLO est utilisé sur la peau pour traiter les personnes âgées de 10 ans et plus atteintes d'acné. Il est recommandé d'utiliser ARAZLO seulement sur le visage chez les enfants de 10 et 11 ans.

Vous devez appliquer une fine couche d'ARAZLO une fois par jour sur toute la zone touchée par l'acné, et pas seulement sur les boutons eux-mêmes. Pour appliquer ARAZLO sur le visage, suivez ces étapes :

ÉTAPE
01

Nettoyez-vous la peau avec un nettoyant doux et tapotez-la avec une serviette propre pour la sécher.



ÉTAPE
02

Déposez sur le bout du doigt une petite quantité d'ARAZLO (environ de la taille d'un pois).



ÉTAPE
03

Appliquez des points de lotion sur votre menton, vos joues, votre nez et votre front. **Évitez tout contact avec les yeux, la bouche, les plis de chaque côté du nez et l'intérieur de la bouche et du nez.**



ÉTAPE
04

Massez doucement sur tout le visage, puis lavez-vous les mains.



ÉTAPE
05

Au besoin, appliquez un hydratant avant ou après l'utilisation d'ARAZLO.



N'en mettez pas trop ! N'utilisez pas plus de lotion que nécessaire pour couvrir les zones traitées. L'utilisation d'une trop grande quantité d'ARAZLO peut augmenter le risque d'irritation de la peau.

Si vous développez des irritations de la peau, votre médecin pourrait vous demander d'utiliser un hydratant, de diminuer la fréquence d'application d'ARAZLO ou d'interrompre complètement le traitement par ARAZLO.

 **ARAZLO^{MC}**
Lotion de tazarotène, 0,045 %

Conseils sur l'utilisation d'ARAZLO



ARAZLO peut augmenter vos risques de coups de soleil. Utilisez un écran solaire ayant un indice de protection d'au moins 30 et portez des vêtements qui peuvent vous protéger du soleil. Cela comprend les lampes solaires. N'appliquez pas ARAZLO sur un coup de soleil.



Si vous êtes enceinte, si vous pensez l'être ou si vous prévoyez le devenir, parlez-en à votre médecin. ARAZLO pourrait nuire à votre enfant à naître.



Si vous allaitez, n'appliquez pas ARAZLO sur vos mamelons ou vos aréoles (parties foncées autour du mamelon).



Évitez les produits pour la peau ou les cosmétiques qui peuvent assécher la peau.



Si vous devez utiliser un autre médicament sur votre peau, comme le peroxyde de benzoyle, pendant le traitement par ARAZLO, appliquez-en un le matin et l'autre, le soir.



N'utilisez pas ARAZLO sur votre cuir chevelu, vos aisselles ou les zones où deux parties de votre peau se touchent.



Prenez note que le vent ou le froid peuvent être plus irritants pour votre peau pendant le traitement par ARAZLO.



Utilisez ARAZLO exactement comme votre médecin vous l'indique.

Lisez le feuillet Renseignements pour le patient sur le médicament pour en savoir plus au sujet d'ARAZLO, y compris ses effets secondaires potentiels.



BAUSCH Health

ARAZLO^{MC} est une marque de commerce de Bausch Health Companies Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Bausch Health, Canada Inc.
2150, boul. Saint-Elzéar Ouest, Laval (Québec) H7L 4A8
© 2021 Bausch Health, Canada Inc. Tous droits réservés.
ARA-09-2021-003 F

